

Usted tiene programada una colonoscopia el \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_.

**Posiblemente tenga que dejar de tomar estos medicamentos ANTES del estudio.**

Píldoras de hierro  
Brilinta (ticagrelor)  
Coumadin (warfarin)  
Effient (prasugrel)  
Eliquis (apixaban)  
Fondaparinux (arixtra)

Persantine (dipyridamole)  
Plavix (clopidogrel)  
Pradaxa (dabigatran)  
Savaysa (edoxaban)  
Ticlid (ticlopidine)  
Xarelto (rivaroxaban)

**Pregunte a su médico o al farmacéutico que le entrega sus medicamentos si puede dejar de tomarlos antes del procedimiento.**

## El DÍA ANTERIOR al estudio

**ESE DÍA NO COMA NINGÚN ALIMENTO. BEBA LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA**

(ninguno rojo o morado). SI COME NO ESTARÁ LISTO para el procedimiento y este no se realizará. LOS LÍQUIDOS CLAROS tienen aspecto transparente: agua, té, jugo de manzana, caldo de pollo, Sprite, gelatina, Gatorade, Powerade, Ensure claro, paletas heladas sin fruta ni helado, café sin crema ni leche.

### Paso 1. Mezcle la primera dosis de MoviPrep®.

Vacíe una bolsa "A" y una bolsa "B" en el recipiente desechable. Agregue agua tibia hasta la primera línea del recipiente. Mezcle para disolver y manténgalo frío.

**Paso 2. Beba la primera dosis a las 6 PM.** Empiece a beber la solución preparada. El recipiente está dividido en 4 marcas. Cada 15 minutos beba la solución hasta llegar a la siguiente marca y usted termine toda la solución preparada.

**Paso 3. Beba 2 tazas o 16 onzas de cualquier líquido claro de su elección durante la siguiente hora.** Este es un paso necesario para estar asegurado de una suficiente hidratación y de una preparación efectiva. Continúe bebiendo líquidos claros hasta que empiece la segunda dosis de MoviPrep® la mañana siguiente.

**El MoviPrep® provoca diarrea. No se aleje del baño.**

## El DÍA del estudio

**NO COMA COMIDA, GOMA DE MASCAR O CAMELOS.**

**TOME SUS MEDICAMENTOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES QUE LE DIERON.**

**Paso 1. Mezcle la segunda dosis de MoviPrep®.** Siga las mismas instrucciones que usó para mezclar la primera dosis.

### Paso 2. Empiece a beber la segunda dosis 4 horas antes de su hora de llegada

\_\_\_\_\_. Empiece a beber la solución preparada. El recipiente está dividido en 4 marcas. Cada 15 minutos beba la solución hasta llegar a la siguiente marca y usted termine toda la solución preparada.

### Paso 3. Beba 2 tazas o 16 onzas de cualquier líquido claro de su elección durante la siguiente hora.

**Paso 4. Pare de beber líquidos claros y termine su preparación 2 horas antes de su hora de llegada. NO BEBA NADA MÁS o se cancelará su procedimiento.**

## IMPORTANTE!

- El DÍA del estudio usted DEBE TENER una persona que le lleve a su casa. Si viaja en autobús, taxi, Uber o un transporte médico, DEBE ir acompañado por una persona adulta.
- NO HABRÁ EXCEPCIONES. ESO ES POR SU SEGURIDAD.
- Planee pasar la mitad del día en su cita.

## DESPUÉS del estudio :

- Usted puede quedarse de 30 a 60 minutos en la sala de recuperación.
- Después del procedimiento, puede tener gases intestinales e hinchazón. Expulse los gases para sentirse mejor.
- Ese día no conduzca, no firme documentos legales y no maneje equipo pesado.
- Después del procedimiento, pida a otra persona que le acompañe durante 24 horas.
- Si tiene dolor de estómago, sangrado o cualquier otro síntoma inusual, por favor llame al servicio Ask My Nurse al 713-634-1110. Enfermeras con experiencia lo pueden ayudar y responder sus preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



**Para ver un video con consejos sobre cómo prepararse, visite [www.bcm.edu/cprit/MoviPrep](http://www.bcm.edu/cprit/MoviPrep)**