

Usted tiene programada una colonoscopia el _____ a las _____.

Posiblemente tenga que dejar de tomar estos medicamentos ANTES del estudio.

Píldoras de hierro
Brilinta (ticagrelor)
Coumadin (warfarin)
Effient (prasugrel)
Eliquis (apixaban)
Fondaparinux (arixtra)

Persantine (dipyridamole)
Plavix (clopidogrel)
Pradaxa (dabigatran)
Savaysa (edoxaban)
Ticlid (ticlopidine)
Xarelto (rivaroxaban)

Pregunte a su médico o al farmacéutico que le entrega sus medicamentos si puede dejar de tomarlos antes del procedimiento.

El DÍA ANTERIOR al estudio

ESE DÍA NO COMA NINGÚN ALIMENTO. BEBA LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA

(ninguno rojo o morado). SI COME NO ESTARÁ LISTO para el procedimiento y este no se realizará. LOS LÍQUIDOS CLAROS tienen aspecto transparente: agua, té, jugo de manzana, caldo de pollo, Sprite, gelatina, Gatorade, Powerade, Ensure claro, paletas heladas sin fruta ni helado, café sin crema ni leche.

Paso 1. Mezcle la primera dosis de MoviPrep®.

Vacíe una bolsa "A" y una bolsa "B" en el recipiente desechable. Agregue agua tibia hasta la primera línea del recipiente. Mezcle para disolver y manténgalo frío.

Paso 2. Beba la primera dosis a las 6 PM. Empiece a beber la solución preparada. El recipiente está dividido en 4 marcas. Cada 15 minutos beba la solución hasta llegar a la siguiente marca y usted termine toda la solución preparada.

Paso 3. Beba 2 tazas o 16 onzas de cualquier líquido claro de su elección durante la siguiente hora. Este es un paso necesario para estar asegurado de una suficiente hidratación y de una preparación efectiva. Continúe bebiendo líquidos claros hasta que empiece la segunda dosis de MoviPrep® la mañana siguiente.

El MoviPrep® provoca diarrea. No se aleje del baño.

El DÍA del estudio

NO COMA COMIDA, GOMA DE MASCAR O CAMELOS.

TOME SUS MEDICAMENTOS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES QUE LE DIERON.

Paso 1. Mezcle la segunda dosis de MoviPrep®. Siga las mismas instrucciones que usó para mezclar la primera dosis.

Paso 2. Empiece a beber la segunda dosis 4 horas antes de su hora de llegada

_____. Empiece a beber la solución preparada. El recipiente está dividido en 4 marcas. Cada 15 minutos beba la solución hasta llegar a la siguiente marca y usted termine toda la solución preparada.

Paso 3. Beba 2 tazas o 16 onzas de cualquier líquido claro de su elección durante la siguiente hora.

Paso 4. Pare de beber líquidos claros y termine su preparación 2 horas antes de su hora de llegada. NO BEBA NADA MÁS o se cancelará su procedimiento.

IMPORTANTE!

- El DÍA del estudio usted DEBE TENER una persona que le lleve a su casa. Si viaja en autobús, taxi, app de viaje compartido, o un transporte médico, DEBE ir acompañado por una persona adulta.
- NO HABRÁ EXCEPCIONES. ESO ES POR SU SEGURIDAD.
- Planee pasar la mitad del día en su cita.

DESPUÉS del estudio :

- Usted puede quedarse de 30 a 60 minutos en la sala de recuperación.
- Después del procedimiento, puede tener gases intestinales e hinchazón. Expulse los gases para sentirse mejor.
- Ese día no conduzca, no firme documentos legales y no maneje equipo pesado.
- Después del procedimiento, pida a otra persona que le acompañe durante 24 horas.
- Si tiene dolor de estómago, sangrado o cualquier otro síntoma inusual, por favor llame al servicio Ask My Nurse al 713-634-1110. Enfermeras con experiencia lo pueden ayudar y responder sus preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Para ver un video con consejos sobre cómo prepararse, visite www.bcm.edu/cprit/MoviPrep